

En Ecuador la Hipertensión Arterial tiene una **alta prevalencia**



1 de cada 5 personas entre 18 y 69 años la padecen¹

❤ La hipertensión ***no controlada*** es responsable del²:

- └ **50%** de los ACVs
- └ **43%** de enfermedades coronarias

❤ ***El control efectivo*** de la presión arterial puede reducir²:

- └ **40%** el riesgo de **accidente cardiovascular**
- └ **25%** el riesgo de **infarto agudo de miocardio**



Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



En el tratamiento
de la **HTA** de
moderada a severa



Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



Reduce el *gasto cardíaco* a través del **bloqueo de la aldosterona** y la pérdida de sodio y agua.³



+10 AÑOS
DE EXPERIENCIA

Brindando **protección cardiovascular y renal** a pacientes con hipertensión



+ 650
RX/AÑO

Avalan la seguridad y eficacia de Besarzid en el **control de la HTA de moderada a severa**



LABORATORIO #1

Acompañando al cuerpo médico y pacientes con **productos de calidad y eficacia comprobada**



Potencia
que lidera



Fuerza
que controla

Besarzid®


Irbesartán - Hidroclorotiazida



Efectos favorables en los **marcadores inflatorios** que aparecen en la aterosclerosis.⁴

Eficacia comprobada y
confianza médica

Últimos 3 años



+1000
PACIENTES



+ 150.000
UNIDADES VENDIDAS

Apoyo al paciente

Plan de Medicación
Continua

2+1



“Siempre junto a ti”



Potencia
que lidera




Fuerza
que controla



Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



Más que una combinación, un tratamiento
diseñado para el **control eficaz y seguro** de
la hipertensión *de moderada a severa*.⁵

Seguridad y eficacia



+10 AÑOS
DE PRESENCIA



+700
PACIENTES/AÑO

Avalan el **beneficio clínico** de Besarzid

Apoyo al paciente

Plan de Medicación
Continua

2+1



“Siempre junto a ti”



Potencia
que lidera

Fuerza
que controla



Besarzid®

Irbesartán - Hidroclorotiazida



- ♥ Fácil adherencia al tratamiento.⁶
- ♥ Concentraciones adecuadas para cada tipo de paciente.⁷



BESARZID
150/12,5 MG



BESARZID
300/12,5 MG



Importado y Distribuido para Ecuador:
BerkanaFarma S.A., Av. Interoceánica E28C y Francisco de Orellana. Quito.
Telf.: (+593 2) 322 2074 / (+593 2) 322 2076
farmacovigilancia@berkanafarma.com / www.berkanafarma.com

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
1)Croom,K. Irbesartán:una revisión de su uso en la HTA y en el manejo de la nefropatía diabética.Drugs;64(9):999-1028
2)Ruiz,L. Perfil farmacocinético/farmacodinámico humano de irbesartán:un potente antagonista del receptor de angiotensina U
3)Borghetti,C.Et. perfil de irbesartán en el tratamiento de pacientes con HTA:una revisión. Integrally práctica.Cardiovasc Prev;19(1): 31
4)Gialama,F and Maniadakis,N.Resumen completo:eficacia y tolerabilidad de Irbesartán.Vas:Gestión de Riesgos Sanitarios;9:575-92
5)Man,AJ.Resumen clínico de Irbesartán:ampliando la ventana terapéutica en HTA.J Hypertens Suplement 15(7):S27-92

 Elea