La vejiga hiperactiva es más común de lo que se imagina....



En América Latina

La vejiga hiperactiva afecta aproximadamente: **al 25% – 40%** de las **mujeres y al 13% – 24%** de los **hombres,** con mayor prevalencia en edades avanzadas[1].

En el tratamiento de la **vejiga hiperactiva** con síntomas de **incontinencia urinaria**



Darisec®

Darifenacina 7,5 mg



Sin interrupciones

1. Camargo, E., Mejía, A., Vélez, C., & Acuña, C. (2018). Prevalence of lower urinary tract symptoms and overactive bladder in men and women over 18 years old: The Colombian Overactive Bladder and Lower Urinary Tract Symptoms (COBaLT) study. Neurourology and Urodynamics, 37(4), 1168-1174.



En el tratamiento de la **vejiga hiperactiva** con síntomas de **incontinencia urinaria**

Darisec®

Darifenacina 7,5 mg

Sin interrupciones

EVIDENCIA CIENTÍFICA

Un estudio publicado en **British Medical Journal en año 2024** analizó el riesgo de uso prolongado de **diferentes anticolinérgicos y evidenció que**[2]:

- Darifenacina tiene **alta especificidad por M3 y reducida afinidad por M1.**
- Darifenacina tiene **baja penetración al sistema nervioso central** y **no está asociado** al **deterioro cognitivo y demencia.**

La elección del anticolinérgico debe considerar **la seguridad cognitiva,** en especial, **en adultos mayores.**

2. Iyen, B., Coupland, C., Bell, B. G., Ashcroft, D. M., Orrell, M. W., Bishara, D., Dening, T., & Avery, A. J. (2024). Risk of dementia associated with anticholinergic drugs for overactive bladder in adults aged ≥55 years: nested case-control study. BMJ medicine.

En el tratamiento de la **vejiga hiperactiva** con síntomas de **incontinencia urinaria**



Darisec®

Darifenacina 7,5 mg

Sin interrupciones

EVIDENCIA CIENTÍFICA

Darifenacina cuenta con amplia experiencia clínica en el manejo de la vejiga hiperactiva.

Su eficacia y seguridad han sido evaluadas en estudios clínicos con un amplio número de pacientes, incluyendo población adulta mayor[3].

Darifenacina cuenta con aprobación de agencias regulatorias FDA[4] y EMA[5].

Elegir un anticolinérgico con experiencia marca la diferencia.

3. Zinner, N. (2008).Darifenacin treatment for overactive bladder in patients who expressed dissatisfaction with prior antimuscarinic therapy. International Journal of Clinical Practice, 62(11), 1664–1674. 4. U.S. Food and Drug Administration. (2023). 5. European Medicines Agency. (2013).

En el tratamiento de la **vejiga hiperactiva** con síntomas de **incontinencia urinaria**

Darisec®

Darifenacina 7,5 mg



Sin interrupciones

- Potente antagonista muscarínico específico para el receptor M3
- Restablece el buen funcionamiento de la vejiga hiperactiva
- Rápido alivio de los síntomas de urgencia urinaria
- No asociado a deterioro de la función cognitiva
- 1 vez al día con o sin alimentos



Presentación
7,5mg x 30 comps. recs.

European Association of Urology [6]

American Urological Association [7]

MPP26-0022

RS: 365250413

6. EAU Guidelines on the Diagnosis and Management of Female Non-neurogenic Lower Urinary Tract Symptoms. European Urology. 7. The AUA/SUFU guideline on the diagnosis and treatment of idiopathic overactive bladder. Journal of Urology.

Elea

Material de uso exclusivo de promoción médica Elea