Más del 50%
de las mujeres adultas experimentará por lo menos **un episodio de infección urinaria** que alterará su calidad de vida[1]
Elea

# FOSFOLEA®

Fosfomicina Trometamol 3g

SIMPLE
SOLUCIÓN

## TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE INFECCIONES URINARIAS BAJAS NO COMPLICADAS

Ante los primeros síntomas de infección urinaria:

- Opción efectiva
- Segura
- Fácil de administrar

1. Sobel JD, Kaye D. Urinary Tract Infections. In: Mandell Gl, Bennet JE, Dolin R (ed). Principles and Practice of Infectious Disease. Fifth ed. New York. Churchill Livingstone, 2000: 662-90

# FOSFOLEA®

Fosfomicina Trometamol 3g

## EVIDENCIA CIENTÍFICA

### GUÍAS DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE UROLOGÍA 2024 [2]

- 3 gramos de **Fosfomicina Trometamol en dosis única,** se considera de primera elección, en el *manejo de infección urinaria baja no complicada.*
- Se recomienda los **cursos cortos de terapia antimicrobiana** para el tratamiento de la *cistitis en el embarazo.*
- Además, utilizar **profilaxis antibiótica continua o postcoital** para prevenir IVUs recurrentes cuando las intervenciones no antimicrobianas han fallado **- RECOMENDACIÓN FUERTE.**

### INFECCIÓN COMUNITARIA DEL TRACTO URINARIO POR E. COLI EN LA ERA DE LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN ECUADOR [3]

- Es fundamental vigilar la *resistencia bacteriana* a nivel de comunidad.
- La tasa de resistencia de E. coli a quinolonas fue del **42.6%** y para trimetroprim sulfametoxazol fue del **52.3%.** Al superar el **20%** de resistencia antibiótica, significa que estos antibióticos *no pueden ser usados como tratamiento empírico.*
- Las alternativas de tratamiento empírico para E. coli incluyen **Fosfomicina.**

### CONSENSO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA [4]

**Evidencia Clínica Para Profilaxis En:**

- Cistoscopia simple con factores de riesgo **dosis única de Fosfomicina trometamol** (grado A-II).
- Resección transuretral de próstata (RTUP) profilaxis con una dosis única de *Fosfomicina Trometamol* (A-II).
- Resección transuretral de tumor vesical y otros procedimientos endourológicos (uretroscopias, *extracción de cálculos,* stents ureterales) se recomienda una **dosis única de trometamol (A-II).**
- Biopsia prostática transrectal se indica con fuerza, grado A-I, una dosis única 1–3h *antes del procedimiento.*

2. Asociación europea de Urología, GUIAS, 2024. 3. Revista MetroCienciaVolumen 30, Número 1, 2022 Editorial Hospital Metropolitano.
4. M.Dolores del Toro López, Javier Arias Días y otros. Resumen ejecutivo del Consenso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Cirugía Española, 2021; 99(1): 11-26

## EN EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES URINARIAS NO COMPLICADAS

# FOSFOLEA®

Fosfomicina Trometamol 3g

SIMPLE
SOLUCIÓN

Eficacia comprobada en diferentes estudios clínicos.

Mínima tasa de resistencia bacteriana.

Recomendado por guías internacionales.

Seguro durante el embarazo. [5]

Respaldo de **ELEA Argentina.**

**Laboratorio #1** en Salud Femenina.

Planta de **tecnología más avanzada** en América Latina.

$

**Precio que garantiza el acceso.**

5. American College of Obstetricians and Gynecologists. Urinary tract infections in pregnant individuals. Clinical Consensus No. 4. ObstetGynecol. 2023;142(2):435–445

EN EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES URINARIAS NO COMPLICADAS

# FOSFOLEA®

Fosfomicina Trometamol 3g

## SIMPLE SOLUCIÓN

1. SOLA TOMA
2. HORAS DESPUÉS DE COMER
3. GRAMOS

Resolución de los síntomas **en las primeras 48 horas.**[6]

Efectos adversos poco frecuentes y **respeta el equilibrio de la microbiota intestinal.**

**Excelente absorción digestiva** debido a la sal de trometamol.

**Sabor Naranja**

**Presentación:** Caja x 1 sobre de polvo para solución oral

Reg. sanitario: 9054–MEE-0524

MPP26-0019

6. Davidov M.I., Meltsina M.N., Bunova N.E., Metelkin A.M., Prussakov O.R., Lunev A.A. Phenazopyridine and fosfomycin for the acute cystitis treatment: results of multicenter randomized study // Urologia. - 2021. - N. 3. - P. 20-27.

**Material de uso exclusivo de promoción médica Elea.**