




**Elea**

**Manejo** *integral de la*  
**salud de la** **MUJER**





# Manejo *integral de la* salud de la **MUJER**

- FOSFOLEA®
- Ovumix<sup>max</sup>
- Carmin®
- Mileva<sup>35</sup>
- Femorel® (I.V.)
- Testri<sup>CB</sup>
- Dansec®
- EVAGINA®
- Divina®
- MIRANDA®
- Aciberkan®
- simpla®
- Caberkana®
- ProGest®
- EVACARE®
- EVACOPA<sup>®</sup> MENSTRUAL

\* Adaptado de Guías de práctica clínica en la osteoporosis postmenopáusica, glucocorticoidea y del varón (actualización 2022). Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral.



En el tratamiento de **vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal y vaginitis mixta**

*Clindamicina 100mg, Ketoconazol 400 mg*  
**Ovumix®**  
*max*  
doble acción, máximo acierto



Gran efecto terapéutico



Mejora de los principales síntomas



Potente acción local con baja absorción sistémica



Mínimos efectos adversos



**Presentación:**  
Caja X 7 óvulos vaginales  
Reg. sanitario: 8124-MEE-0623





# En planificación familiar

Para la **mujer joven:**  
1era etapa reproductiva



**Presentación:** Caja X 28 comprimidos: 21+7  
Reg. sanitario: 8297-MEE-0823

## ¡4 importantes razones para sentirse **Divina!**

Alta eficacia anticonceptiva<sup>(1-2)</sup>

Disminuye el peso corporal<sup>(1)</sup>

Mejora la piel<sup>(2-3)</sup>

Mayor bienestar premestrua<sup>(4)</sup>

Para la mujer **mayor de 35 años:**  
última etapa reproductiva



**Presentación:** Caja X 28 comprimidos: 24+4  
Reg. sanitario: 3065-MEE-1017

**+ Simple**

Menstruación más cortas y leves

Larga vida media

Efecto neutro en:

- Parámetros metabólicos
- Peso
- Líbido
- Proliferación y riesgo de Ca mama

Para la mujer en **etapa de lactancia**



**Presentación:** Caja X 28 comprimidos  
Reg. sanitario: 4492-MEE-1218

## El anticonceptivo de la lactancia

Píldora sin estrógenos con eficacia similar a los ACOS

Mujeres con varices, migraña, fumadoras, obesas

Menor sangrado irregular



En **hiperandrogenismo**

Gran potencia antiandrogénica

Alta eficacia antiacné

Adecuado para la seborrea e hirsutismo



¡Para mostrarse  
**tal como es!**

**Presentación:**  
Caja X 21 comprimidos

Reg. sanitario: 30270-07-12



# En **trastornos** relacionados a **insuficiencia de progesterona**

## Para la mujer en todas sus etapas

Trastornos del ciclo

Amenaza de aborto, aborto recurrente


Amenaza de parto pretérmino

Soporte en la fase lútea

Inseminación artificial, reproducción asistida FIV



**Presentación:**  
Progest 100mg caja x 30 cápsulas blandas  
Reg. sanitario: 1145-MEE-0715



**Presentación:**  
Progest 200mg caja x 30 cápsulas blandas  
Para uso oral y vaginal  
Reg. sanitario: 1162-MEE-0715



## Adiós a la hiperprolactinemia



**Presentación:**  
Caja X 2 tabletas y X 8 tabletas  
Reg. sanitario: 360000312

Supresión de la lactancia fisiológica

Tratamiento de los desórdenes hiperprolactinémicos, incluyendo:

- Amenorrea
- Oligomenorrea
- Anovulación
- Galactorrea

Dosis habitual: 0.25mg -  
2mg a la semana



## En osteoporosis

Eficaz y seguro en la prevención y tratamiento de la Osteoporosis

Aumenta la DMO y disminuye riesgo de fracturas

Una alternativa para cada tipo de paciente




**Presentación:**  
Caja X 1 comprimido recubierto  
Reg. sanitario: 30189-04-12



**Presentación:**  
Caja X 1 jeringa prellenada  
Reg. sanitario: 363900113

### Riesgo moderado

- \* DMO columna < -2,5 T
- \* DMO en CF > -2,0 T
- \* Ausencia de fracturas
- \* Edad < 65 años



**Más del 50%**  
de las mujeres adultas  
experimentará por lo menos  
**un episodio de infección  
urinaria** que alterará su  
calidad de vida<sup>1</sup>



# FOSFOLEA<sup>®</sup>

Fosfomicina Trometamol 3g

SIMPLE  
**SOLUCIÓN**

## TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE INFECCIONES URINARIAS BAJAS NO COMPLICADAS

Ante los primeros síntomas de infección urinaria:

✓  
Opción  
efectiva

✓  
Segura

✓  
Fácil de  
administrar



# FOSFOLEA®

Fosfomicina Trometamol 3g

## EVIDENCIA CIENTÍFICA

### GUÍAS DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE UROLOGÍA 2024 <sup>2</sup>

- 3 gramos de **Fosfomicina Trometamol en dosis única**, se considera de primera elección, en el *manejo de infección urinaria baja no complicada*.
- Se recomienda los **cursos cortos de terapia antimicrobiana** para el tratamiento de la *cistitis en el embarazo*.
- Además, utilizar **profilaxis antibiótica continua o postcoital** para prevenir IVUs recurrentes cuando las intervenciones no antimicrobianas han fallado - **RECOMENDACIÓN FUERTE**.

### INFECCIÓN COMUNITARIA DEL TRACTO URINARIO POR E. COLI EN LA ERA DE LA RESISTENCIA ANTIBIÓTICA EN ECUADOR <sup>3</sup>

- Es fundamental vigilar la *resistencia bacteriana* a nivel de comunidad.
- La tasa de resistencia de E. coli a quinolonas fue del **42.6%** y para trimetoprim sulfametoxazol fue del **52.3%**. Al superar el **20%** de resistencia antibiótica, significa que estos antibióticos *no pueden ser usados como tratamiento empírico*.
- Las alternativas de tratamiento empírico para E. coli incluyen **Fosfomicina**.

### CONSENSO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA <sup>4</sup>

- Evidencia Clínica Para Profilaxis En:**
- Cistoscopia simple con factores de riesgo **dosis única de Fosfomicina trometamol** (grado A-II).
  - Resección transuretral de próstata (RTUP) profilaxis con una dosis única de *Fosfomicina Trometamol* (A-II).
  - Resección transuretral de tumor vesical y otros procedimientos endourológicos (uretroscopias, *extracción de cálculos*, stents ureterales) se recomienda una **dosis única de trometamol (A-II)**.
  - Biopsia prostática transrectal se indica con fuerza, grado A-I, una dosis única **1-3h antes del procedimiento**.

EN EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES URINARIAS NO COMPLICADAS

# FOSFOLEA®

Fosfomicina Trometamol 3g

SIMPLE  
**SOLUCIÓN**

Eficacia comprobada en diferentes estudios clínicos.



Respaldo de **ELEA Argentina.**

Mínima tasa de resistencia bacteriana.



**Laboratorio #1** en Salud Femenina.

Recomendado por guías internacionales.



Planta de **tecnología más avanzada** en América Latina.

Seguro durante el embarazo.<sup>5</sup>



**Precio que garantiza el acceso.**



EN EL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES URINARIAS NO COMPLICADAS

# FOSFOLEA®

Fosfomicina Trometamol 3g

SIMPLE  
SOLUCIÓN

1. SOLA TOMA

2. HORAS DESPUÉS  
DE COMER

3. GRAMOS

Resolución de los síntomas  
en las primeras 48 horas.<sup>6</sup>

Efectos adversos poco  
frecuentes y **respeto el equilibrio  
de la microbiota intestinal.**

**Excelente absorción digestiva**  
debido a la sal de trometamol.



**Sabor Naranja**

**Presentación:** Caja x 1 sobre  
de polvo para solución oral

Reg. sanitario: 9054-MEE-0524



6. Davidov M.I., Meltsina M.N., Bunova N.E., Metelkin A.M., Prussakov O.R., Lunev A.A. Phenazopyridine and fosfomycin for the acute cystitis treatment: results of multicenter randomized study // Urologia. - 2021. - N. 3. - P. 20-27.

# HPB: UN PROBLEMA QUE DETIENE LA VIDA DE MILLONES

La HPB es una de las **primeras causas de consulta urológica** en hombres > 50 años<sup>1</sup>



En Ecuador:

Cerca del **50% de los hombres** entre **50–65 años** presenta **HPB o cambios compatibles**<sup>2</sup>

En el tratamiento de la **Hiperplasia Prostática Benigna**



*Silox*<sup>®</sup>  
**Silox**<sup>®</sup>  
SILODOSINA 4 mg

*La vida*  
EN **PLAY**





**Silox**<sup>®</sup>  
SILODOSINA 4 mg

La vida  
EN **PLAY**

## EVIDENCIA CIENTIFICA:

Un metaanálisis publicado en European Urology en año 2022 analizó la selectividad de los antagonistas alfa-1 para los diferentes subtipos de receptores y su impacto clínico.<sup>3</sup>

### SE EVIDENCIÓ:



**LA SILODOSINA** tiene una mayor selectividad por el receptor alfa-1A que la tamsulosina.



**LA SILODOSINA** es considerada más potente por su alta selectividad hacia los receptores alfa-1 A.



**LA SILODOSINA** mejora la relajación prostática: la reducción de síntomas y mejora del flujo urinario es más rápido y efectivo.



**LA SILODOSINA** tiene menos efectos adversos asociados con la hipotensión ortostática y otras complicaciones cardiovasculares.



**LA UROSELECTIVIDAD MARCA DIFERENCIA**


# En el tratamiento de la **Hiperplasia Prostática Benigna**

**Silox**<sup>®</sup>  
SILODOSINA 4 mg

La vida  
EN **PLAY**

## **EVIDENCIA CIENTIFICA:**

Un metaanálisis publicado en British Journal of Clinical Pharmacology analizó la efectividad de silodosina, tamsulosina, placebo y se evidenció que la silodosina:<sup>4</sup>



- 1** Mejor tasa de expulsión.
- 2** Reduce el tiempo de expulsión.
- 3** Reduce los episodios de dolor cólico.

**LA SILODOSINA ACELERA LA EXPULSIÓN  
DE CÁLCULOS URETERALES**

# En el tratamiento de la **Hiperplasia Prostática Benigna**

  
**Silox**<sup>®</sup>  
SILODOSINA 4 mg

La vida  
EN **PLAY**



**PRESENTACIÓN:**  
4mg x 30 cáps.



Alfa bloqueante de mayor Selectividad.



Eficacia comprobada en el alivio de los síntomas de HPB.



Frecuencia de hipotensión comparable a placebo<sup>5</sup>.



**Elea**

Adaptado de las guías **EAU**<sup>6</sup>

RS: 1160-MEE-0715

5. Cornu, J. N., Gacci, M., Hashim, H., Herrmann, T. R. W., Malde, S., Netsch, C., De Nunzio, C., Rieken, M., Sakalis, V., & Tutolo, M. (2023). 6. EAU Guidelines on non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), including benign prostatic obstruction (BPO). European Association of Urology.

MPP26-0021



**La vejiga hiperactiva** es más común de lo que se imagina....

## En América Latina

**La vejiga hiperactiva afecta** aproximadamente: **al 25% – 40%** de las **mujeres** y **al 13% – 24%** de los **hombres**, con mayor prevalencia en edades avanzadas<sup>1</sup>.





En el tratamiento de la **vejiga hiperactiva**  
con síntomas de **incontinencia urinaria**



**Darisec**<sup>®</sup>

*Darifenacina 7,5 mg*



*Sin interrupciones* 



En el tratamiento de la **vejiga hiperactiva**  
con síntomas de **incontinencia urinaria**

**Darisec**<sup>®</sup>

*Darifenacina 7,5 mg*



*Sin interrupciones*



## **EVIDENCIA CIENTÍFICA**

Un estudio publicado en **British Medical Journal** en año **2024** analizó el riesgo de uso prolongado de **diferentes anticolinérgicos** y evidenció que<sup>2</sup>:



Darifenacina tiene **alta especificidad por M3** y **reducida afinidad por M1**.



Darifenacina tiene **baja penetración al sistema nervioso central** y **no está asociado al deterioro cognitivo y demencia**.

La elección del anticolinérgico debe considerar **la seguridad cognitiva**, en especial, **en adultos mayores**.



En el tratamiento de la **vejiga hiperactiva**  
con síntomas de **incontinencia urinaria**



**Darisec**<sup>®</sup>

*Darifenacina 7,5 mg*



*Sin interrupciones*



## EVIDENCIA CIENTÍFICA



Darifenacina cuenta con amplia experiencia clínica en el manejo de la vejiga hiperactiva.



Su eficacia y seguridad han sido evaluadas en estudios clínicos con un amplio número de pacientes, incluyendo población adulta mayor<sup>3</sup>.



Darifenacina cuenta con aprobación de agencias regulatorias FDA<sup>4</sup> y EMA<sup>5</sup>.

**Elegir un anticolinérgico con experiencia marca la diferencia.**



En el tratamiento de la **vejiga hiperactiva**  
con síntomas de **incontinencia urinaria**

# Darisec<sup>®</sup>

*Darifenacina 7,5 mg*

*Sin interrupciones*



Potente antagonista muscarínico  
específico para el receptor M3



Restablece el buen funcionamiento  
de la vejiga hiperactiva



Rápido alivio de los síntomas de  
urgencia urinaria



No asociado a deterioro de la  
función cognitiva



1 vez al día con o sin alimentos



**Presentación**  
7,5mg x 30 comps. recs.

**EAU**  
European  
Association  
of Urology<sup>6</sup>



**American  
Urological  
Association<sup>7</sup>**

RS: 365250413

6. EAU Guidelines on the Diagnosis and Management of Female Non-neurogenic Lower Urinary Tract Symptoms. European Urology. 7. The AUA/SUFU guideline on the diagnosis and treatment of idiopathic overactive bladder. Journal of Urology.

**Elea**

MPP26-0022



**En Ecuador** se considera que alrededor del **19% de los adultos mayores de 65 años** presentan ***Osteoporosis***<sup>1</sup>



Debido al incremento de la expectativa de vida en la población mundial, la evaluación y el manejo de la Osteoporosis se ha vuelto más relevante

El 30-40%  
de las mujeres  
y el 13% de  
los hombres

en el mundo tienen riesgo de fracturas  
osteoporóticas a lo largo de la vida<sup>2</sup>

Más del 50% de pacientes con osteoporosis suspenden  
su tratamiento en el primer año tras iniciarlo<sup>3</sup>



En Osteoporosis

 **simpla**

Ácido Zoledrónico 5 mg / 100 ml

**La vida** *en acción* 

Reduce **significativamente** el riesgo de fracturas por Osteoporosis<sup>1</sup>:

 70 %

Vertebrales

 41 %

Cadera

 25%

No Vertebrales

**1**

**Una sola  
dosis, un año  
de protección**



# En Osteoporosis

# simpla

Ácido Zoledrónico 5 mg / 100 ml

La vida *en acción* 

## Beneficio al paciente:



Reduce significativamente el riesgo de fracturas por Osteoporosis



Infusión IV anual que garantiza la eficacia terapéutica



Administración gratuita\*

El **acceso** al tratamiento es clave para preservar  
la **autonomía** y el **bienestar a largo plazo**

\* Centros autorizados



# En Osteoporosis

# simpla

Ácido Zoledrónico 5 mg / 100 ml

La vida *en acción*

## ÁCIDO ZOLEDRÓNICO COMO TERAPIA SECUENCIAL: UNA RECOMENDACIÓN BASADA EN GUÍAS

Decisión clínica de SUSPENDER denosumab (clínica, adherencia, preferencia del paciente)<sup>1</sup>

NO suspender sin cobertura antirresortiva


Riesgo de rebote óseo acelerado y fracturas vertebrales múltiples

Iniciar terapia antirresortiva secuencial

Ácido zoledrónico IV (≈ 6 meses tras la última dosis de denosumab)

Mantener densidad mineral ósea y reducir riesgo de fracturas

El tratamiento no es solo iniciar bien...  
**es acompañar al paciente a lo largo del tiempo**






# En Osteoporosis

# simpla

Ácido Zoledrónico 5 mg / 100 ml

**La vida** *en acción* 

-  **Facilita el acceso al tratamiento.**
-  **Reduce significativamente el riesgo de fracturas**
-  **Mayor adherencia y fácil de administrar**

# 1

**Una sola dosis,  
un año de protección**




**Presentación: Caja x 1 solución inyectable**  
Reg. Sanitario: H6220713

Material de uso exclusivo de promoción médica Elea.



**TICKET “BRILLA POR TRES”**



BRILLA POR TRES



**76%** de la población ecuatoriana presenta  
**déficit de Vitamina D'**





La deficiencia de **Vitamina D**  
es un problema de salud pública

**Testri<sup>®</sup> CB**

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X 3**





PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D



# Testri<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X3**

- ✓ Permite alcanzar rápidamente **niveles óptimos de 25(OH)D**
- ! Papel importante sobre **metabolismo mineral, óseo, síndrome metabólico y sistema inmune**
- ≡ Respaldo de **Elea**
  - ≡ Más de **80 años** de historia **en el mercado argentino**
  - ≡ **Planta de tecnología más avanzada** de América Latina
  - ≡ La **vitamina D** de 100mil UI con **mayor venta en Argentina**

Precio que garantiza acceso

**\$23<sup>33</sup>**



PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D

 **Testri**<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X3**

**Colecalciferol** es la forma más usual de **Vitamina D**



**100 mil UI**

Alcanza rápidamente niveles óptimos de 25(OH)D: >40ng/ml



**100 mil UI**

Dosificación más estudiada



**100 mil UI**

Seguridad comprobada



**100 mil UI**

Precio que garantiza el acceso

**\$23<sup>33</sup>**



PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D

# Testri<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X 3**

## Impacto del déficit de Vitamina D en SALUD FEMENINA:



**Mujeres asintomáticas:** alteraciones en la función endocrina y la salud reproductiva femenina.<sup>1</sup>



**Embarazo:** mayor riesgo de preeclampsia y diabetes gestacional.<sup>2</sup>



**Fertilidad y SOP:** resistencia a la insulina y alteraciones ovulatorias en mujeres con SOP.<sup>3</sup>



**Trastornos menstruales:** mayor frecuencia de irregularidades menstruales.<sup>4</sup>



**Disfunción sexual femenina:** baja libido, menor lubricación vaginal y trastornos del orgasmo.<sup>5</sup>



PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D

# Testri<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X 3**

## Impacto del déficit de Vitamina D en sistema MUSCULOESQUELÉTICO E INMUNOLÓGICO:



**Dolor musculoesquelético crónico:** mayor intensidad de dolor musculoesquelético y mialgias.<sup>1</sup>



**Osteoporosis y fracturas:** pérdida de masa ósea y mayor riesgo de fracturas.<sup>2</sup>



**Enfermedades reumatológicas autoinmunes:** mayor actividad inflamatoria en artritis reumatoide y lupus.<sup>3</sup>



**Fibromialgia y Sarcopenia:** mayor dolor, fatiga y deterioro de la función muscular.<sup>4</sup>





PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D

# Testri<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X 3**

## Impacto del déficit de Vitamina D en sistema ENDÓCRINO Y METABÓLICO



**Metabolismo y resistencia a la insulina:** mayor resistencia a la insulina y menor control metabólico.<sup>1</sup>



**Diabetes y riesgo cardiometabólico:** mayor riesgo de diabetes tipo 2 y complicaciones metabólicas.<sup>2</sup>



**Homeostasis del calcio y salud ósea:** favorece hiperparatiroidismo secundario, pérdida ósea y mayor riesgo de fractura.<sup>3</sup>



**Obesidad:** en pacientes con obesidad, el déficit de vitamina D es más frecuente por su secuestro en tejido adiposo, pudiendo requerir dosis mayores para su corrección.<sup>4</sup>





PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D

# Testri<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X 3**

**La deficiencia de Vitamina D se asocia con alteraciones en la fertilidad masculina**

**La deficiencia de vitamina D está asociada a<sup>1</sup>:**

- ② Menor recuento total de espermatozoides
- ② Menor concentración
- ② Alteraciones morfológicas








PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D

# Testri<sup>®</sup> CB





Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

## BRILLA X 3

### EFFECTOS SOBRE METABOLISMO MINERAL Y ÓSEO

-  Regula la homeostasis de Ca y P
-  Previene la Osteoporosis
-  Disminuye el riesgo de fracturas

### EFFECTOS EXTRAÓSEOS

-  Sistema Inmunitario
-  Sistema Cardiovascular
-  Metabolismo de la glucosa y Diabetes Mellitus Tipo 2
-  Salud Sexual y Reproductiva



PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D

# Testri<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X 3**

**1 cápsula  
cada 1 o 3 meses**

Prevención del  
**DÉFICIT**  
>30 ng/ml

**1 cápsula  
por mes**


Tratamiento de  
**INSUFICIENCIA**  
Entre 20 y 30 ng/ml

**2 cápsulas  
por mes**

Tratamiento de  
**DEFICIENCIA**  
< 20 ng/ml



1. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007. 2. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, Murad MH, Weaver CM. Endocrine Society Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011.



PARA EL DÉFICIT DE VITAMINA D

# Testri<sup>®</sup> CB

Vitamina D3 (Colecalciferol) 100.000 UI

**BRILLA X 3**

Presentación x 3 cápsulas blandas

Precio que garantiza acceso

**\$23<sup>33</sup>**

Asegura adherencia y respalda resultados.



PRESENTACIÓN:

**CAJA X 3** CÁPSULAS BLANDAS  
**CAJA X 1** CÁPSULA BLANDA

Reg. sanitario: 814-MEE-0623

MPP26-0016

Material de uso exclusivo de promoción médica Elea.

CREER EN SU DOCTOR

# ES SU *Naturaleza*



La mujer es detallista por naturaleza. Es protectora. Es intuitiva. Es cíclica. Su naturaleza es una VIRTUD y escucharte es su estándar de calidad.



Una línea de bienestar íntimo consciente.



TENER ACTITUD  
ES SU

*Naturalaleza*

EVAGINA®

Gel vaginal hipoalergénico, de base acuosa y uso diario, con ácido hialurónico que lubrica, suaviza e hidrata la zona "V",  
**LA MÁS VULNERABLE.**



### Respaldo clínico

- ↓ **Ácido Hialurónico:** Mantiene la hidratación de la mucosa y confort.
- ↓ **Aloe Vera:** Calma y reduce el ardor y prurito.
- ↓ **Ácido Láctico:** Mantiene el pH ácido, protegiendo la microbiota vaginal.
- ↓ **L-Arginina:** Mejora la circulación local y favorece la respuesta sexual.

Una opción no hormonal,  
efectiva y bien tolerada.



Sequedad vaginal por menopausia, postparto, anticonceptivos orales, quimioterapia.



Dispareunia, ardor, picor, molestias con ropa íntima o deportes.



Apoyo en terapias hormonales locales o para facilitar exámenes.

### Beneficios diferenciales



#### Sequedad vaginal:

Hidratación inmediata y prolongada.



#### Sexualidad:

Mejora el placer en las relaciones sexuales.



#### Compatibilidad :

Puede usarse con preservativos y dispositivos (Evacopa®, juguetes).



Evagina®, es una alternativa clínica efectiva y segura para la piel más íntima.



# VIVIR LIBRE ES SU Naturalaleza



**EVAGOPA**  
MENSTRUAL

La copa menstrual diseñada con silicona de grado farmacéutico. Hipoalergénica, segura y reutilizable hasta por **10 AÑOS.**

Recomendable para mujeres desde la adolescencia.

Útil en casos de alergias a productos desechables.

## El paso hacia una menstruación más consciente y saludable.



TOALLA



TAMPÓN



EVAGOPA

50% más humedad<sup>1</sup>

Mayor incidencia de candidiasis<sup>2</sup>

Desechable y contaminante

Altera pH vaginal<sup>3</sup>

Riesgo de irritación<sup>4</sup>

Cambios frecuentes

Menor riesgo de humedad y no altera el pH vaginal<sup>5</sup>

Reduce infecciones<sup>6</sup>

12h de comodidad, sin residuos

### Beneficios diferenciales



#### Medio ambiente:

Sustituye hasta 9.000 productos desechables. Reduce 45 toneladas de residuos por cada 1.000 mujeres.



#### Económico:

Ahorro de más del 90% de gastos frente a toallas o tampones en 10 años.



#### Salud íntima:

Menor riesgo de infecciones urogenitales y vaginosis bacteriana.



#### Estilo de vida:

Hasta 12 horas de comodidad continua. Ideal para deporte, viajes, trabajo y sueño.



Evacopa® representa una opción validada, moderna y clínicamente segura para la gestión menstrual que también promueve salud, conciencia y libertad.

1: Sarani Sasidaran, Prateek Kachoria, Antony Raj, Sudha Ramalingam, Brian R. Stoner, Katelyn L. Sellgren, Sonia Grego. Physical properties of menstrual hygiene waste as feedstock for onsite disposal technologies. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development* 1 May 2021; 11 (3): 474-482. doi: <https://doi.org/10.2166/washdev.2021.262>

2: Gomes, B. G., & Islam, M. R. (2024). Analysis of Vaginal Candidiasis Prevalence Among Bangladeshi Women in Relation to Menstrual Hygiene and Other Risk Factors: A Cross-Sectional Study. *Qeios*. <https://doi.org/10.32388/Scard>

3: Stern, T., & Kluger, R. (2004). pH reducing formulation. <https://www.freepatentsonline.com/y2005/0196429.html>

4: Oram, C., & Beck, J. (1982). The tampon: investigated and challenged. *Women & Health*, 6, 105-122. [https://doi.org/10.1300/J013V06N03\\_13](https://doi.org/10.1300/J013V06N03_13)

5: Van Eijk AM, Zulaika G, Lenchner M, et al. "Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis." *The Lancet Public Health*, 2019; 4(8): e376-e393

6: Howard C, Rose CL, Trouton K, Stamm H, Marentette D, Kirkpatrick N, Karalic S, Fernandez R, Paget J. "Flow: a randomized controlled trial comparing menstrual cup to tampons or pads." *Canadian Family Physician*. 2011 Jun;57(6):e208-15

LEER LA LETRA PEQUEÑA

ES SU

*Naturalaleza*

EVACARE®

*Si se hidrata la piel del rostro*

*¿por qué no la zona íntima?*



Jabón íntimo con ácido hialurónico de uso diario formulado para limpiar suavemente la zona vulvar.

- Respeta el pH fisiológico (≈ 4.5 – 5.5) de la zona vulvovaginal.
- No altera la microbiota ni reseca la mucosa.
- Libre de alcohol, colorantes y detergentes agresivos.
- Testeado dermatológica y ginecológicamente.



**Compatibilidad**  
Apto para uso diario.



**Protección**  
Evita la irritación y picazón.



**Hidratación**  
El Ácido Hialurónico hidrata profundamente y favorece la elasticidad del epitelio.<sup>1</sup>



Evacare® no solo limpia, también hidrata y deja una sensación suave, respetando el equilibrio natural.



1. Ramos-e-Silva, M., & da Silva Carneiro, S. C. (2007). El ácido hialurónico y sus aplicaciones en dermatología y estética. *Actas Dermo-Sifiligráficas*, 98(3), 196-201. [https://doi.org/10.1016/S0001-7310\(07\)73299-3](https://doi.org/10.1016/S0001-7310(07)73299-3)

CUIDAMOS  
SU  
*Naturaleza*



***Su cuerpo, su cuidado.***


SOMOS  
**EVA**



Reg. San. N° 13015-DME-0422

Reg. San. N° NSOC01173-22EC

Reg. San. N° 14094-DME-0123



Material de uso exclusivo para profesionales de la salud.

