LAS NÁUSEAS Y EL VÓMITO SON SÍNTOMAS COMUNES QUE PUEDEN REDUCIR LA CALIDAD DE VIDA O INDICAR UNA ENFERMEDAD POTENCIALMENTE MORTAL.

LAS NÁUSEAS Y LOS VÓMITOS AGUDOS DURAN HASTA 7 DÍAS. [1]

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

FDA APPROVED

En el tratamiento de la náusea y vómito

CONDICIONES PARA LAS NÁUSEAS Y LOS VÓMITOS AGUDOS (DURAN HASTA 7 DÍAS). [1]

- Embarazo temprano. [2]
- Cefaleas migrañosas agudas. [2]
- Efectos adversos de la medicación. [2]
- Gastroenteritis. [2]

ODF PHARMA

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

FDA APPROVED

Ondalenz®

Proporciona:

* Mayor biodisponibilidad.[2]
- Absorción rápida.[2]
- Disolución rápida.[2]
- Rápido inicio de acción.[2]
- Tecnología con nanopartículas y ODF

Gracias a sus gránulos auto-nanoemulsionados (SSNEGs) de clorhidrato de Ondansetrón, que están diseñados para mejorar su biodisponibilidad oral al aumentar su solubilidad acuosa y facilitar su absorción. [2]

ODF PHARMA

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

FDA APPROVED

Película Bucodispersable.

Detiene los vómitos actuando a nivel central y periférico. [3]

Tiene aprobación FDA como **categoría B en embarazo.** [4]

PERFIL DE SEGURIDAD

No existe asociación del uso de Ondalenz® con resultados fetales adversos de acuerdo a los datos disponibles. [4]

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

FDA APPROVED

En un estudio con 1.349 bebés nacidos de mujeres que informaron haber usado ondansetrón o que recibieron una receta de ondansetrón durante el primer trimestre, **NO se observó, un mayor riesgo de malformaciones congénitas graves en el análisis agregado.**[4]

El segundo estudio examinó a 1.970 mujeres que recibieron una receta de ondansetrón durante el embarazo y **NO se informó ninguna asociación entre la exposición al ondansetrón y malformaciones congénitas graves, aborto espontáneo o muerte fetal, y bebés con bajo peso al nacer o pequeños para la edad gestacional.**[4]

Documento informativo de la FDA para la reunión del Comité Asesor de Comunicación de Riesgos del 5 al 6 de marzo de 2018. [4]

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

FDA APPROVED

Es el primer ODF de Ondansetrón en ECUADOR.[5]

- **Ondalenz®** **Acción rápida.**[2]
- **Ondalenz®** Ejerce un efecto mediante **absorción pre-gástrica desde la boca,** faringe y esófago.[3]
- **Ondalenz®** Evita el efecto del primer paso.[2]
- **Ondalenz®** **No requiere líquidos** para su ingesta.[2]
- **Ondalenz®** Tiene tecnología con **nanopartículas.**[2]
- **Ondalenz®** Con agradable **sabor a FRESA.**[2]

Posología en adultos:

PESO	DOSIS
Adultos	8 mg

Hasta 3 veces al día.[4]

ODF PHARMA

REFERENCIAS

1. MedlinePlus. (2025). How to use MedlinePlus pages, content, and links. U.S. National Library of Medicine. https://medlineplus.gov/about/using/citation/
2. Bala, R., Khanna, S., Pawar, P., & Arora, S. (2013). Orally dissolving strips: A new approach to oral drug delivery system. International Journal of Pharmaceutical Investigation, 3(2), 67-76.
3. Colombia. Ministerio de Salud y Proteccion Social; Colciencias; Universidad de Antioquia. (2013). Guia de practica clinica para prevenciOn, diagnostic° y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niiios menores de 5 atios (Guia No. 8). Bogota, Colombia: Ministerio de Salud y Proteccion Social – COLC1ENCIAS.
4. FDA (2018). FDA Briefing Document, Risk Communication Advisory Committee Meeting (5-6 March 2018). U.S. Food and Drug Administration.
5. Iquia, Diciembre 2025.

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

FDA APPROVED

Ondalez tiene mayores beneficios vs otros:

Característica	ONDALEZ ODF	Tableta sublingual	Vía intravenosa (IV)
Forma Farmaceutica	Película ultradelgada que se disuelve en la lengua (ODF)	Tableta bajo la lengua	Solución inyectable
Administración	Sin agua, sin necesidad de tragar	Requiere mantener bajo la lengua	Requiere acceso venoso
Facilidad de uso	Muy alta (ideal en cualquier lugar)	Alta	Baja (solo entorno clínico)
Comodidad en vómitos	Excelente (no necesitas tragar)	Buena	Excelente
Biodisponibilidad	Alta	Alta	Alta
Portabilidad	Muy alta (ligero, fácil de llevar)	Media	Nula
Necesidad de personal médico	No	No	Sí
Riesgos asociados	Bajos	Bajos	Mayor riesgo (infección, acceso venoso)
Uso ideal	Casa, viajes, urgencias leves-moderadas-severos	Uso doméstico	Hospital, casos severos
Costo/recursos	Costo accesible	Alto	Alto (por infraestructura)
Sabor	Agradable sabor a Fresa	Desconocido	No aplica
Tecnología Nanoparticulas	Si	Desconocido	Desconocido

ODF PHARMA