



**LAS NÁUSEAS Y EL VÓMITO
SON SÍNTOMAS COMUNES
QUE PUEDEN REDUCIR LA
CALIDAD DE VIDA O INDICAR
UNA ENFERMEDAD
POTENCIALMENTE MORTAL.⁵**


**LAS NÁUSEAS Y LOS
VÓMITOS AGUDOS DURAN
HASTA 7 DÍAS.⁵**



Ondalenz[®]

Ondansetrón 4mg / 8 mg

CONDICIONES PARA LAS NÁUSEAS Y LOS VÓMITOS AGUDOS (DURAN HASTA 7 DÍAS).⁵





Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

Proporciona: **Ondalenz®**

- * Mayor biodisponibilidad.⁴
- Absorción rápida.⁴
- Disolución rápida.⁴
- Rápido inicio de acción.⁴
- Tecnología con nanopartículas y ODF



Gracias a sus gránulos auto-nanoemulsionados (SSNEGs) de clorhidrato de Ondansetrón, que están diseñados para mejorar su biodisponibilidad oral al aumentar su solubilidad acuosa y facilitar su absorción.⁴



NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg



Detiene los vómitos actuando central y periférica.¹

- Antagonista potente y altamente selectivo del receptor 5-HT₃.¹
- El efecto se debe al antagonismo de los receptores 5-HT₃ en neuronas localizadas tanto en el sistema nervioso periférico como central.¹



NUEVO

Ondalenz[®]

Película oral soluble de 4mg/8 mg.



NUEVO

Ondalenz[®]
Ondansetrón 4mg / 8 mg



Película Bucodispersable


Detiene los vómitos actuando a nivel central y periférica.⁵

Meta-análisis comparando 24 estudios controlados aleatorizados, incluyendo 3482 niños, comparando Metoclopramida, Ondansetrón, Domperidona, Dexametasona, Dimenhidrinato y Granisetron.²

NUEVO

Ondalenz[®]

Película oral soluble de 4mg/8 mg.



REF: PEDIATRICS Volume 145, number 4, April 2020:e20193260

Ondalenz película bucodispersable (Ondansetron) fue la única terapia que redujo la necesidad de rehidratación intravenosa y el número de episodios de vómitos.²


NUEVO

Ondalenz[®]

Película oral soluble de 4mg/8 mg.

- **Ondalenz[®]** único ODF en el Ecuador.
- **Ondalenz[®]** aprobado por la FDA desde 2010 para el tratamiento de náuseas y vómitos.⁴

Mejor opción en pacientes pediátricos y geriátricos, con disfagia y tripanofobia.³



PESO	DOSIS
Adultos	8 mg
Niños	4 mg

NUEVO

Ondalenz[®]
Película oral soluble de 4mg/8 mg.



Para tratamiento de vómito y náusea

Ondalenz[®] Acción rápida.⁴

Ondalenz[®] Único producto con tecnología de nanopartículas.⁴

Ondalenz[®] No requiere líquidos para su ingesta.⁴

Ondalenz[®] Muy útil en NIÑOS o pacientes con disfagia. (problema de deglución).⁴

Ondalenz[®] Adecuado cuando la náusea dificulta tragar pastillas.²

Ondalenz[®] Con agradable sabor a FRESA.



NUEVO

Ondalenz®

Película oral soluble de 4mg/8 mg.



Su posología para adultos y niños:

PESO	DOSIS
Adultos	8 mg
Niños	4 mg



1. Colombia. Ministerio de Salud y Protecciem Social; Colciencias; Universidad de Antioquia. (2013). Guio de proctica clinica pars prevencion, diagnostic° y tratamiento de la enfermedad diarreica agudo en niiiios menores de 5 arias (Guia No. 8). Bogota, Colombia: Ministerio de Salud y ProtecciOn Social – COLCIENCIAS. 2. Barot, K. S., Vaghasiya, K. N., Suhagiya, G. H., Singh, A. P., Nadeem, S., Qureshi, A. N., & Kutiyana, S. (2024). Comparing the efficacy of ondansetron, domperidone, and metoclopramide in treating vomiting in pediatric patients with acute gastroenteritis: A network meta-analysis. Cureus, 16(8), e67902. 3. Universidad Nacional de Loja. (2023). Algoritmos medicos de patologias frecuentes en pediatric (Version 2). Loja, Ecuador. . 4. Bala, R., Khanna, S., Pawar, P., & Arora, S. (2013). Orally dissolving strips: A new approach to oral drug delivery system. International Journal of Pharmaceutical Investigation, 3(2), 67-76. 5. MedlinePlus. (2025). How to use MedlinePlus pages, content, and links. U.S. National Library of Medicine. <https://rnechineplus.gov/about/usingjcitation/>

