

A woman with a shaved head is shown from the chest up, sitting in a hospital bed. She is wearing a light blue hospital gown over a pink shirt. Her expression is somber. In the background, medical equipment is visible. The right side of the image has a green gradient overlay with white and red text.

**EL 70-90% DE LAS
PERSONAS QUE
RECIBEN
QUIMIOTERAPIA**

**TIENE NÁUSEA Y
VÓMITO.¹**



Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

INDICADO EN NÁUSEAS Y VÓMITOS INDUCIDAS POR QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA

Las náuseas y los vómitos inducidos por **Quimioterapia** tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes que reciben terapia antineoplásicos.³





Ondalenz®


Ondansetrón 4mg / 8 mg

Nauseas y vómitos inducidos por **Radioterapia**
El riesgo de náuseas y vómito aumentan a medida que las dosis de radiación son mayores, más frecuentes y alcanzan más áreas el cuerpo.³



Cabeza y cuello,
extremidades, mama.

Irradiación corporal
total



Prevenir las náuseas y vómitos es el objetivo.³

ONDALENZ (Ondansetrón) está aprobado por la FDA por la prevención de náuseas y vómitos relacionados con radioterapia y quimioterapia en niños y adultos.³



Ondalenz®

Ondansetrón 4mg / 8 mg

**Es el primer Ondansetrón ODF
en el mercado Ecuatoriano.**



- Estas son tiras delgadas de polímero diseñados para adherirse al entrar en contacto con la mucosa bucal y luego disolverse con saliva.²
- **Ondalenz®** es la mejor opción para todos los pacientes (pediátricos, geriátricos, embarazadas con disfagia y con tripanofobia.)²
- Sin dolor.²
- Sin riesgo de infección o absceso.²
- **Ondalenz®** evita el primer paso.²
- **Ondalenz®** se absorbe en segundos y actúa en minutos.²
- **Ondalenz®** acción rápida.²
- **Ondalenz®** no requiere líquidos para su ingesta.²

NUEVO

Ondalenz[®]

Ondansetrón 4mg / 8 mg



Ondalenz[®] es una opción eficaz, novedosa, conveniente y accesible para el **tratamiento de náusea y vómito.**³

Estudio prospectivo, radomizado, doble ciego, placebo, estudio controlado, 173 mujeres, edades 18-65.³

En un ensayo prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 173 mujeres de 18 a 65 años de edad sometidas a procedimientos laparoscópicos ginecológicos bajo anestesia general fueron aleatorizadas en 4 grupos para recibir placebo, ondansetrón IV 4 mg, ODF de ondansetrón 4 mg y ODF de ondansetrón 8 mg.³




NUEVO

Ondalenz®


Ondansetrón 4mg / 8 mg



Incidencia de Náuseas



Incidencia de Vómito



No hay diferencia significativa en la eficacia entre IV y ODF

No hay diferencia significativa en la eficacia entre **Ondalenz®** y Ondansetrón IV.³

- Incidencia de náuseas.³
- Incidencia de vómito.³

NUEVO

Ondalenz[®]

Ondansetrón 4mg / 8 mg



Ondalenz[®] ODF proporciona:

- Disolución rápida.²
- Absorción rápida.²
- Inicio de acción rápido.²
- Mayor biodisponibilidad.²
- Los gránulos sólidos auto-nanoemulsionante (SSNEGs) de carbohidrato de Ondansetrón están diseñadas para mejorar, su biodisponibilidad oral al aumentar su solubilidad acuosa.⁵
- Facilita la absorción.



REFERENCIAS

1. Fernandez Perez, Y. (2012). Incidencia de la emesis inducida por quimioterapia: Grupos de riesgo (Ponencia). Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
2. Bala, R., Khanna, S., Pawar, P., & Arora, S. (2013). Orally dissolving strips: A new approach to oral drug delivery system. International Journal of Pharmaceutical Investigation, 3(2), 67-76
3. FDA (2018). FDA Briefing Document, Risk Communication Advisory Committee Meeting (5-6 March 2018). U.S. Food and Drug Administration.
4. National Cancer Institute. (2025). Nausea and vomiting related to cancer treatment (PDCM—Health professional version. U.S. National Institutes of Health.
5. Balakumar, K., Raghavan, C. V., Selvan, N. T., Prasad, R. H., & Abdu, S. (2013). Self-nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS) of ondansetron: Formulation and evaluation. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(3), 647-652.