

**ENTRE EL 15%
Y 25% DE LA
POBLACIÓN
PEDIÁTRICA
PUEDE PRESENTAR
NÁUSEA Y
VÓMITO.¹**



NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg

En el tratamiento de
la náusea y el vómito



LA NÁUSEA Y EL VÓMITO PUEDE OCASIONAR

Deshidratación
y fatiga.²

Ansiedad y
miedo a volver
a vomitar.²

Ausentismo
escolar.²

Ansiedad y
preocupación
de los padres.²

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg



ENFOQUE DEL MANEJO DEL VÓMITO Y NÁUSEAS ES:

- Control oportuno de la náusea y vómito.³
- Facilita la tolerancia oral.³
- Prevenir la deshidratación.³
- Disminuir la hospitalización y estrés familiar.³

NUEVO

Ondalenz[®]

Ondansetrón 4mg



- **Detiene el vómito actuando a nivel central y periférico.**⁴
- **Agonista potente y altamente selectivo de los receptores 5-HT₃.**⁴
- **Ondalenz[®] Primer ondansetrón ODF en el mercado ecuatoriano**⁶

NUEVO

Ondalenz[®]

Ondansetrón 4mg



Características	Ondalez ODF	Tabletas / Cápsulas
Necesita agua para tomar	✓ No. ⁵	✗ Si
Fácil de tragar	✓ Muy fácil. ⁵	✗ Puede ser difícil
Útil con náuseas severas	✓ Si. ⁵	✗ Depende del caso
Comodidad/ Portabilidad	✓ Alta. ⁵	✗ Moderada
Absorción rápida	✓ Rápida disolución. ⁵	✗ Buena pero requiere digestión
Sabores y tolerancia oral	✓ Sabor a fresa. ⁵	✗ Desconocido

NUEVO

Ondalenz[®]
Ondansetrón 4mg



Tratamiento de náusea y vómito

Ondalenz[®] Acción rápida.⁵

Ondalenz[®] Único producto con tecnología de nanopartículas.⁵

Ondalenz[®] No requiere líquidos para su ingesta.⁵

Ondalenz[®] Muy útil en **NIÑOS** o pacientes con disfagia. (problema de deglución).¹

Ondalenz[®] Adecuado cuando la náusea dificulta tragar pastillas.⁵

Ondalenz[®] Con agradable sabor a **FRESA**.

NUEVO

Ondalenz®

Ondansetrón 4mg



Posología para niños:⁴

PESO	DOSIS
8 - 15 KG	2 mg
15 - 30 KG	4 mg
> 30 KG	8 mg

REF.4



REFERENCIAS

1. Bernada Scarrone, M. M., & Le Pera Garofalo, V. (2024). Síntomas y problemas gastrointestinales en niños asistidos por equipos de cuidados paliativos pediátricos. Estudio observacional. *Andes Pediatría*, 95(1), 24-33.

2. Consolini, D. M., & Pekarsky, A. R. (2025). Náuseas y vómitos en lactantes y niños. En *Manual MSD (versión para profesionales)*.

3. Freedman, S. B., Adler, M., Seshadri, R., & Powell, E. C. (2006). Oral ondansetron for gastroenteritis in a pediatric emergency department. *New England Journal of Medicine*, 354(16), 1698-1705.

4. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social; Colciencias; Universidad de Antioquia. (2013). *Guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años (Guía No. 8)*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social – COLCIENCIAS.

5. Bala, R., Khanna, S., Pawar, R., & Arora, S. (2013). Orally dissolving strips: A new approach to oral drug delivery system. *International Journal of Pharmaceutical Investigation*, 3(2), 67-76.

6. Iquimbia, diciembre 2025.